



Chouette de Tengmalm
ou, encore, **Chouette**
boréale est un petit
rapace nocturne.

Difficile à observer, elle
est protégée au niveau
européen .



Le **lièvre arctique** est un petit mammifère recouvert de fourrure, adapté à un environnement froid (polaire ou de haute montagne)

Son principal prédateur est le loup arctique, mais l'ours, le renard polaire peuvent aussi le chasser.



Le **renard polaire** vit dans des milieux où les températures sont très basses en hiver. Il peut résister à des températures de $-50\text{ }^{\circ}\text{C}$. Cet animal très robuste ne connaît que peu de prédateurs.



Lemmings ce sont des petits rongeurs qui vivent généralement dans les régions arctiques.



Les **loups arctiques** vivent dans le nord du Canada, de l'Alaska, du Groenland. Le territoire y est couvert de neige et de glace à l'année, tandis que la température peut descendre jusqu'à -60 degrés.

Les loups chassent surtout les lemmings et les lièvres, en solitaire, tandis qu'ils s'attaquent aux plus grands animaux, tels les caribous et les bœufs musqués, en meute.



Le grizzli ou grizzly est un mammifère omnivore au Nord des États-Unis et au Canada.

À l'état sauvage il existe entre 30 000 et 45 000 individus.

Avant de gagner la tanière fermée par la neige où il dormira tout l'hiver, le grizzli gratte et peigne sa fourrure hivernale toute neuve qu'il perdra au printemps. Il se choisit une tanière protégée, une grotte, une crevasse ou un tronc creux pour passer les mois d'hiver à dormir.